SSPH

Newsletter 01/2025

Schweizerische Gesellschaft
für Pulmonale Hypertonie

Swiss Society for Pulmonary Hypertension SSPH
Schweizerische Gesellschaft für Pulmonale Hypertonie SGPH
Socit Suisse pour l'Hypertension Pulmonaire SSHP
Societ Svizzera per l'ipertensione Polmonare SSIP

Swiss Society for Pulmonary Hypertension SSPH
Schweizerische Gesellschaft für Pulmonale Hypertonie SGPH
Socit Suisse pour l'Hypertension Pulmonaire SSHP
Societ Svizzera per l'Ipertensione PolmonareSSIP

Risikostratifizierung und Behandlungsziele bei pulmonal arterieller Hypertonie

Platin Sponsor

Bronze Sponsor

Der Newsletter der Schweizerischen Gesellschaft fr Pulmonale Hypertonie (SGPH) vereint aktuelle Informationen, Entwicklungen und Forschungsergebnisse rund um das Thema pulmonale Hypertonie. Unser Ziel ist es, Sie ber neue Erkenntnisse, bevorstehende Veranstaltungen und wichtige Neuigkeiten aus der PH-Community auf dem Laufenden zu halten und somit das Bewusstsein fr die Erkrankung weiter zu frdern.

Unser besonderer Dank gilt unseren Sponsoren, MSD und Gebro Pharma, deren Untersttzung diese Publikation ermglicht. Ebenso mchten wir allen Mitgliedern der Newsletter-Group fr ihr Engagement und ihre wertvolle Arbeit bei der Erstellung dieses Newsletters danken.

Wir wnschen Ihnen viel Freude bei der Lektre!

Schweizerische Gesellschaft fr
Pulmonale Hypertonie

Autoren

Prof. Dr. med. Silvia Ulrich, Zrich
PD Dr. med. Mona Lichtblau, Zrich
Dr. med. Benoit Lechartier, Lausanne
fr die [Arbeitsgruppe SSPH Newsletter](#)

Swiss Society for Pulmonary Hypertension SSPH
Schweizerische Gesellschaft für Pulmonale Hypertonie SGPH
Socit Suisse pour l'Hypertension Pulmonaire SSHP
Societ Svizzera per l'Ipertensione Polmonare SSIP

Zusammenfassung

Die Risikostratifizierung spielt eine zentrale Rolle bei der Prognoseeinschtzung und therapeutischen Steuerung von Patient*innen mit pulmonal arterieller Hypertonie (PAH). Zu den drei wichtigsten nicht-invasiven prdiktiven Parametern zhlen die WHO/NYHA-Funktionsklasse (FC), die 6-Minuten-Gehstrecke (6MWD) sowie das NT-proBNP/BNP. Diese Variablen sind Bestandteil aller etablierten Risikostratifizierungsinstrumente. Ihre Aussagekraft ist jedoch begrenzt, insbesondere aufgrund eingeschrnkter Spezifitt hinsichtlich des Schweregrads der PAH, was die individuelle Therapieplanung erschwert.

Zukünftig knnten Marker des pulmonal-vaskulren Remodellings – insbesondere unter Kombinationstherapien und neuen PAH-Medikamenten – und der Adaptation des rechten Herzens auf den erhhten Pulmonaldruck (coupling) an Bedeutung gewinnen. Whrend die Erreichung eines niedrigen Mortalittsrisikos gemss validierten Scores weiterhin ein zentrales Therapieziel bleibt, zeigen erste Daten, dass invasive hmodynamische Messungen und kardiale Bildgebung zustzlichen Nutzen fr therapeutische Entscheidungen bieten knnten.

Einleitung

Obwohl erste Prognosemodelle zur Einschtzung der berlebenswahrscheinlichkeit bei PAH-Patient*innen auf das NIH-Register der 1990er-Jahre zurckgehen, wurde die Risikostratifizierung erst mit den ESC/ERS-Leitlinien von 2015 fester Bestandteil des PAH-Managements. Diese basieren auf einem Expertenkonsens und umfassen Parameter wie die WHO/NYHA-Funktionsklasse (FC), 6-Minuten-Gehstrecke (6MWD) sowie BNP/NT-proBNP. Mit den Leitlinien von 2022 wurde die Risikostratifizierung zentral in den PAH-Therapiealgorithmus integriert. Die 7. Task Force des 7. Welt-Symposiums fr pulmonale Hypertonie (WSPH) hat die verfgbare Evidenz analysiert, Limitationen bestehender Strategien diskutiert, neue Daten bewertet und Empfehlungen zur Optimierung der Risikobewertung ausgesprochen.

Besondere Herausforderungen bestehen bei pdiatrischen und erwachsenen Patient*innen mit PAH infolge angeborener Herzfehler (PAH-AHF). Diese stellen eine heterogene Gruppe dar – insbesondere bei syndromalen AHF oder Eisenmenger-Syndrom – und erfordern eine individualisierte, interdisziplinre Betreuung.

Swiss Society for Pulmonary Hypertension SSPH
Schweizerische Gesellschaft für Pulmonale Hypertonie SGPH
Socit Suisse pour l'Hypertension Pulmonaire SSHP
Societ Svizzera per l'Ipertensione Polmonare SSIP

Risikostratifizierung und Behandlungsziele bei pulmonal arterieller Hypertonie

Die Risikostratifizierung spielt eine zentrale Rolle bei der Vorhersage von Prognosen und der Steuerung der Therapie von Patient*innen mit PAH. Die drei wichtigsten nicht-invasiven prädiktiven (Faktoren sind die FC, die 6MWD und BNPs) sind in allen derzeit validierten Risikostratifizierungsinstrumenten enthalten, [1, 2]. Aufgrund ihrer limitierten Spezifitt sind sie jedoch nicht immer ausreichend fr individualisierte Therapieentscheidungen. Marker des pulmonal-vaskulren Remodelings sowie invasive hmodynamische Parameter und kardiale Bildgebung gewinnen zunehmend an Bedeutung[3].

Risikostratifizierung bei PAH

1. Klinische Merkmale und WHO-Funktionsklasse

Die FC ist Bestandteil aller etablierten Scores und ist als Klinischer Endpunkt wichtig. In REVEAL werden zustzlich Herzfrequenz und systolischer Blutdruck erfasst. Symptome wie Anzeichen eines Rechtsherzversagens beeinflussen Therapieentscheidungen wesentlich.

2. Krperliche Leistungsfhigkeit

Die 6MWD ist ein etablierter, kostengnstiger Belastungstest, der signifikant mit Prognose, Lebensqualitt und Morbiditt/Mortalitt assoziiert ist.^{[1],[4],[5],[6],[7]}

Spiroergometrie: Die maximale Sauerstoffaufnahme (VO₂peak) und ventilatorische Effizienz (VE/VCO₂) korrelieren mit der Prognose, besonders in Kombination mit dem indexierten Schlagvolumen (SVI) ergibt sich ein Mehrwert bei intermedirem Risiko. ^{[8, 9], [10], [11],[10, 12]}

3. Biomarker

BNP und NT-proBNP sind etablierte prognostische Biomarker der Herzinsuffizienz und PAH[13, 14]. Weitere Biomarker werden derzeit intensiv erforscht.

4. Kardiale Bildgebung

Echokardiografie und MRT sind bedeutend zur Beurteilung der Rechtsherzfunktion. Parameter wie Rechtsatriale (RA) -und Rechtsventrikuläre (RV)- Fläche, RV-Wanddicke, Trikuspid annular plane systolic excursion (TAPSE), Tissue Doppler S' Velocity (TDIs'), RV-Fractional Area Change (FAC), RV-longitudinal free wall strain (RVFWLS), RV-Funktion, linksventrikulärer Exzentrizitätsindex (LV-EI), Tricuspid regurgitant velocity (TRV), abgeleiteter systolischer pulmonal arterieller Druck (sPAP), TAPSE/sPAP, Diameter und Atemvariabilität der inferioren Vena cava (VCI), Vorliegen eines Perikardergusses, RV-Ejektionsfraktion zeigen prognostische Relevanz. Die prognostische Aussagekraft wurde jedoch meist in monozentrischen Studien untersucht, was die Vergleichbarkeit limitiert. [15]

5. Invasive Hämodynamik

Die Parameter Herzindex (CI), SVI, die pulmonal-arterielle Compliance (PAC) und die gemischt venöse Sauerstoffsättigung (SvO₂), mPAP und RAP korrelieren mit Prognose. Besonders der CI unter Belastung zeigt prognostischen Wert. In der Nachsorge ergibt sich ein Zusatznutzen meist nur bei intermediärem Risiko.^{[1], 6, [16], [17, 18], [19, 20], [21-23]}

6. Patient Reported Outcome Measures (PROMs)

Krankheitsspezifische Lebensqualität-Instrumente wie emPHasis-10 oder CAMPHOR sind prognostisch relevant ^{[24], [25]}.

7. Multiparametrische Risikobewertung

Multivariate Modelle (z.B. COMPERA, REVEAL) kombinieren klinische, funktionelle, biochemische und hämodynamische Parameter ^{[26], [27]}. Vor Therapiebeginn empfiehlt sich COMPERA-3-Strata oder REVEAL. Im Verlauf: COMPERA 2.0 oder REVEAL Lite 2.

Swiss Society for Pulmonary Hypertension SSPH
Schweizerische Gesellschaft für Pulmonale Hypertonie SGPH
Société Suisse pour l'Hypertension Pulmonaire SSHP
Società Svizzera per l'Ipertensione Polmonare SSIP

Limitierungen und neue Entwicklungen

- FC ist subjektiv und anfällig für Fehleinschätzungen.
- 6MWD ist beeinflusst durch Alter, Fitness, Komorbiditäten.
- BNPs spiegeln globale kardiale Belastung wider, jedoch limitiert durch externe Faktoren wie Alter, Nierenfunktion, Linksherzerkrankungen.
- Parameter wie TAPSE/sPAP können die bestehende Risikostratifizierung ergänzen [38].
- Die routinemässige Nachsorge mittels RHK-Untersuchung ist durch die Invasivität der Untersuchung limitiert. Implantierbare Geräte, die kontinuierlich den mPAP messen und übermitteln, können falls von weiteren Studien bestätigt eine Alternative darstellen, sofern entsprechende Ressourcen zur zeitnahen Auswertung vorhanden sind
- Es ist wichtig, dass bei risikobasierten Therapiestrategien auch individuelle Faktoren berücksichtigt werden und verschiedene modifizierbare und nicht-modifizierbare Prognosefaktoren einbezogen werden (z.B. Alter und Nierenfunktion) sowie der Schweregrad der PAH berücksichtigt wird (z.B. Hämodynamik und kardiale Bildgebung)

Eine Risikostratifizierung, die für den Behandlungsentscheid herangezogen wird, sollte Parameter enthalten, welche drei wichtige Kriterien erfüllen:

1. prognostische Wertigkeit
2. Beurteilung der Schwere der PH und/oder rechtsventrikulären Funktion; und
3. Modifizierbarkeit durch Behandlung.

Ausgewählte Parameter aus invasiver Hämodynamik und/oder kardialen Bildgebungsverfahren (Echokardiographie oder cMRI), können diese Anforderungen erfüllen und die Limitation von gängigem Risiko Scores (WHO-FC, 6MWD und BNP/NT-proBNP) überbrücken.

Swiss Society for Pulmonary Hypertension SSPH
Schweizerische Gesellschaft für Pulmonale Hypertonie SGPH
Socit Suisse pour l'Hypertension Pulmonaire SSHP
Societ Svizzera per l'Ipertensione Polmonare SSIP

Referenzen

1. Boucly, A., et al., *Risk stratification refinements with inclusion of haemodynamic variables at follow-up in patients with pulmonary arterial hypertension*. Eur Respir J, 2024. 64(3)
2. Boucly, A., et al., *Risk assessment in pulmonary arterial hypertension*. Eur Respir J, 2018. 51(3).
3. Dardi, F., et al., *Risk stratification and treatment goals in pulmonary arterial hypertension*. Eur Respir J, 2024.
4. Cenedese, E., et al., *Measurement of quality of life in pulmonary hypertension and its significance*. Eur Respir J, 2006. 28(4): p. 808-15.
5. Moutchia, J., et al., *Minimal Clinically Important Difference in the Six-Minute Walk Distance for Patients with Pulmonary Arterial Hypertension*. Am J Respir Crit Care Med, 2023.
6. Lee, W.T., A.J. Peacock, and M.K. Johnson, *The role of per cent predicted 6-min walk distance in pulmonary arterial hypertension*. Eur Respir J, 2010. 36(6): p. 1294-301.
7. Benza, R.L., et al., *Predicting survival in pulmonary arterial hypertension: insights from the Registry to Evaluate Early and Long-Term Pulmonary Arterial Hypertension Disease Management (REVEAL)*. Circulation, 2010. 122(2): p. 164-72.
8. Deboeck, G., et al., *Exercise testing to predict outcome in idiopathic versus associated pulmonary arterial hypertension*. Eur Respir J, 2012. 40(6): p. 1410-9.
9. Appenzeller, P., et al., *Prediction of maximal oxygen uptake from 6-min walk test in pulmonary hypertension*. ERJ Open Res, 2022. 8(2).
10. Badagliacca, R., et al., *Incremental value of cardiopulmonary exercise testing in intermediate-risk pulmonary arterial hypertension*. J Heart Lung Transplant, 2022. 41(6): p. 780-790.
11. Ewert, R., et al., *Prognostic value of cardiopulmonary exercise testing in patients with systemic sclerosis*. BMC Pulm Med, 2019. 19(1): p. 230.
12. Martinez-Menaca, A., et al., *Simplified risk stratification based on cardiopulmonary exercise test: A Spanish two-center experience*. Pulm Circ, 2024. 14(1): p. e12342.
13. Frantz, R.P., S. McDevitt, and S. Walker, *Baseline NT-proBNP correlates with change in 6-minute walk distance in patients with pulmonary arterial hypertension in the pivotal inhaled treprostinil study TRIUMPH-1*. J Heart Lung Transplant, 2012. 31(8): p. 811-6.
14. Frantz, R.P., et al., *Baseline and Serial Brain Natriuretic Peptide Level Predicts 5-Year Overall Survival in Patients With Pulmonary Arterial Hypertension: Data From the REVEAL Registry*. Chest, 2018. 154(1): p. 126-135.
15. Alabed, S., et al., *Establishing minimally important differences for cardiac MRI endpoints in pulmonary arterial hypertension*. Eur Respir J, 2023. 62(2).
16. Badagliacca, R., et al., *Pulmonary pressure recovery in idiopathic, hereditary and drug and toxin-induced pulmonary arterial hypertension: determinants and clinical impact*. Vascul Pharmacol, 2022. 146: p. 107099.
17. Sitbon, O., et al., *Long-term response to calcium channel blockers in idiopathic pulmonary arterial hypertension*. Circulation, 2005. 111(23): p. 3105-11.
18. Gerhardt, F., et al., *Positive Vasoreactivity Testing in Pulmonary Arterial Hypertension: Therapeutic Consequences, Treatment Patterns, and Outcomes in the Modern Management Era*. Circulation, 2024. 149(20): p. 1549-1564.
19. Chaouat, A., et al., *Prognostic value of exercise pulmonary haemodynamics in pulmonary arterial hypertension*. Eur Respir J, 2014. 44(3): p. 704-13.
20. Douschan, P., et al., *Prognostic Value of Exercise as Compared to Resting Pulmonary Hypertension in Patients with Normal or Mildly Elevated Pulmonary Arterial Pressure*. Am J Respir Crit Care Med, 2022. 206(11): p. 1418-1423.
21. Hoeper, M.M., et al., *Mortality in pulmonary arterial hypertension: prediction by the 2015 European pulmonary hypertension guidelines risk stratification model*. Eur Respir J, 2017. 50(2).
22. Boucly, A., et al., *Risk assessment, prognosis and guideline implementation in pulmonary arterial hypertension*. Eur Respir J, 2017. 50(2).
23. Benza, R.L., et al., *Development and Validation of an Abridged Version of the REVEAL 2.0 Risk Score Calculator, REVEAL Lite 2, for Use in Patients With Pulmonary Arterial Hypertension*. Chest, 2021. 159(1): p. 337-346.
24. Hoeper, M.M., et al., *Phase 3 Trial of Sotatercept for Treatment of Pulmonary Arterial Hypertension*. N Engl J Med, 2023. 388(16): p. 1478-1490.
25. Lewis, R.A., et al., *EmPHasis-10 health-related quality of life score predicts outcomes in patients with idiopathic and connective tissue disease-associated pulmonary arterial hypertension: results from a UK multicentre study*. Eur Respir J, 2021. 57(2).
26. Thenappan, T., et al., *Survival in pulmonary arterial hypertension: a reappraisal of the NIH risk stratification equation*. Eur Respir J, 2010. 35(5): p. 1079-87.
27. Yogeswaran, A., et al., *Comparison of Contemporary Risk Scores in All Groups of Pulmonary Hypertension: A Pulmonary Vascular Research Institute GoDeep Meta-Registry Analysis*. Chest, 2024. 166(3): p. 585-603.

Swiss Society for Pulmonary Hypertension SSPH
Schweizerische Gesellschaft für Pulmonale Hypertonie SGPH
Socit Suisse pour l'Hypertension Pulmonaire SSHP
Societ Svizzera per l'Ipertensione Polmonare SSIP

SSPH Broschren und Gesundheitstagebuch

Broschre „Pulmonale Hypertonie“

Die von der SSPH neu berarbeitete Broschre "Pulmonale Hypertonie" kann nun bei der Herzstiftung bestellt oder heruntergeladen werden.

[Zur Broschre](#)

Broschre „Pulmonale Hypertonie und Reisen“

Das Reisen kann bei gewissen Betroffenen mit pulmonaler Hypertonie aus verschiedenen Grnden eine Herausforderung sein, die nicht zuletzt dazu fhren kann, dass Betroffene auf das Reisen verzichten.

Die Broschre «PH und Reisen» beinhaltet hierbei wertvolle Ratschlge, um wichtige Aspekte fr Betroffene bei der Reiseplanung zu beachten, mgliche Komplikationen whrend dem Urlaub zu vermeiden und ein sicheres Gefhl auf Reisen zu generieren.

Die Broschre „Pulmonale Hypertonie und Reisen“ kann kostenfrei bei der SSPH Geschftsstelle bestellt werden.

ssph@meister-concept.ch

[Download](#)

Swiss Society for Pulmonary Hypertension SSPH
Schweizerische Gesellschaft für Pulmonale Hypertonie SGPH
Socit Suisse pour l'Hypertension Pulmonaire SSHP
Societ Svizzera per l'Ipertensione Polmonare SSIP

Broschre „Pulmonale Hypertonie und Diuretika“

Die Vermeidung einer Rechtsherzinsuffizienz ist eine der wichtigsten Ziele der Behandlung von PH-Patientinnen und -Patienten. In der Broschre «PH und Diuretika» werden die Anzeichen einer Rechtsherzinsuffizienz und deren prventiven Massnahmen erklrt sowie die Wirkung und das Nutzen der Diuretika mit praktischen Tipps erlutert.

Die Broschre „Pulmonale Hypertonie und Reisen“ kann kostenfrei bei der SSPH Geschftsstelle bestellt werden.

ssph@meister-concept.ch

[Download](#)

Gesundheitstagebuch

Das SGPH Gesundheitstagebuch ermglicht es Betroffenen, Symptome und Vitalparameter regelmssig festzuhalten und zu berwachen. Es frdert somit eine aktive Gesundheitskontrolle und kann als wertvolle Gesprchsgrundlage bei Arztbesuchen dienen. Durch das Festhalten von Mustern knnen Patientinnen und Patienten auch gezielt Anpassungen in ihrem Selbstmanagement vornehmen. Dies kann zu einer erhhten Selbstwirksamkeit fhren (vgl. z.B. Studie von Park LG et al. (2017)). Mit dem Gesundheitstagebuch der SGPH knnen Fachpersonen und Betroffene gemeinsame Entscheidungen treffen und eine patientenzentrierte Pflege sowie eine aktive und verantwortungsvolle Haltung der Betroffenen strken.

Das Gesundheitstagebuch kann kostenfrei bei der SSPH Geschftsstelle bestellt werden.

ssph@meister-concept.ch

Swiss Society for Pulmonary Hypertension SSPH
Schweizerische Gesellschaft für Pulmonale Hypertonie SGPH
Société Suisse pour l'Hypertension Pulmonaire SSHP
Società Svizzera per l'Ipertensione Polmonare SSIP

Events im Bereich pulmonale Hypertonie

September 2025

04.09.2025: 2. SSPH Workshop und Annual Meeting, Welle 7 Bern
ab 27.09.2025: [ERS Congress, Amsterdam](#)

März 2026

05./06.03.2025: SSPH Kongress, Engelberg